

نظام جرعات SUFLAVE

SUFLAVE هو نظام لجرعة مُقسَّمة (على يومين). يلزم تناول زجاجتين (2) للتحضير التام لتنظيف القولون. ستتناول زجاجتين (2) من السائل في جرعتين منفصلتين. تكافئ الجرعة الواحدة من SUFLAVE زجاجة واحدة، إضافة إلى كيس واحد لتحسين النكهة.



الزجاجات والأكياس لا تظهر بالحجم الفعلي.

اليوم الأول، الجرعة الأولى: في وقت مبكر من مساء اليوم السابق لخضوعك لتنظيف القولون

ابدأ تناول الجرعة الأولى الساعة ____ مساءً.

الخطوة 1

افتح أحد كيسي تحسين النكهة، واسكب المحتويات في إحدى الزجاجتين.

الخطوة 2

املاً الزجاجة بالماء الفاتر حتى خط الملاء. بعد رد غطاء الزجاجة، رُج الزجاجة برفق إلى أن يختلط كل المسحوق جيداً (يدوب). للحصول على أفضل طعم، ضع المحلول في المبرّد لمدة ساعة قبل تناوله. يجب عدم تجميد المحلول. يُستخدم في غضون 24 ساعة.

الخطوة 3

اشرب 8 أونصات من المحلول كل 15 دقيقة حتى تفرغ الزجاجة.

الخطوة 4

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء خلال الأمسية.

هام: إذا شعرت بغثيان أو انتفاخ أو تقلصات في البطن، توقف مؤقتاً عن شرب المحلول والماء الإضافي أو أبطئ من معدل الشرب إلى أن تقل الأعراض.



الزجاجات والأكياس لا تظهر بالحجم الفعلي.

اليوم الثاني، الجرعة الثانية: صباح يوم تنظيف القولون (5 إلى 8 ساعات

قبل تنظيف القولون، ولكن ليس قبل أقل من 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى).

ابدأ تناول الجرعة الثانية الساعة ____ مساءً.

الخطوة 1

كرر الخطوات من 1 إلى 3 كما في اليوم الأول، الجرعة الأولى.

الخطوة 2

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء خلال الصباح.

هام: استمر في شرب السوائل الشفافة فقط حتى موعد تنظيف القولون. توقف عن شرب السوائل قبل ساعتين على الأقل من تنظيف القولون.

توقف عن شرب السوائل قبل ساعتين على الأقل من تنظيف القولون.

يُرجى الاطلاع على الجانب الآخر لمزيد من الإرشادات الإضافية.



النهائية

ما الذي يجب عليك تناوله في اليوم السابق لتنظير القولون

يُرجى اتباع نظام غذائي قليل البقايا/الألياف، وعدم تناول أي شيء بعد بدء تحضير الأمعاء. تناول الأطعمة المسموح بها، ما لم يعط طبيبك تعليمات بخلاف ذلك.

ما يمكنك فعله

- يمكنك تناول وجبة إفطار قليلة البقايا فقط. تشمل أطعمة الإفطار القليلة البقايا البيض، والخبز الأبيض، والجن القريش، والزبادي، وجريش الذرة، والقهوة، والشاي.
- يمكنك شرب السوائل الشفافة.

ما لا يمكنك فعله

- لا تشرب الحليب ولا تأكل أو تشرب أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتناول مُسهّلات أخرى خلال استخدام SUFLAVE.
- لا تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة من بدء تناول كل جرعة من SUFLAVE.
- في حال تناول مضاد حيوي من نوع تيتراسيكلين أو فلوروكينولون أو تناول الحديد أو الديجوكسين أو الكلوربرومازين أو البنيسيلامين، تناول تلك الأدوية قبل ساعتين على الأقل من تناول كل جرعة من جرعتي SUFLAVE أو بعدها بما لا يقل عن 6 ساعات.

السوائل التي يمكن شربها

- القهوة والشاي (دون إضافة الحليب أو مبيض القهوة غير المُصنَّع من الحليب)
- عصائر الفواكه (دون اللب)
- الحلوى الجيلاتينية (دون فواكه أو إضافات)
- الماء
- عصير الليمون
- حساء الدجاج

ملاحظات

- SUFLAVE هو مسهل تناضحي يوصى باستخدامه لتنظيف القولون للتحضير لإجراء تنظير القولون عند البالغين.
- تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية. قد يؤثر SUFLAVE على مفعول الأدوية الأخرى.
- قد لا يتم امتصاص الأدوية التي تتناولها عن طريق الفم بشكل ملائم في حال تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء تناول كل جرعة من SUFLAVE.
- أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا بعد تناول SUFLAVE هي الغثيان، وانتفاخ البطن، والقيء، وألم في البطن، والصداع.
- إذا شعرت بغثيان أو انتفاخ أو تقلصات في البطن، توقف مؤقتًا عن شرب المحلول والماء الإضافي أو أبطئ من معدل الشرب إلى أن تقل الأعراض.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك إذا عانيت من قيء شديد أو علامات الجفاف بعد تناول SUFLAVE أو إذا عانيت من عدم انتظام ضربات القلب أو نوبات تشنجية.
- إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول SUFLAVE، اتصل بطبيبك.

(يُرجى الاطلاع على الصفحة الأخرى لمزيد من الإرشادات الإضافية.)

تعليمات خاصة من مُقدِّم الرعاية الصحية

الإجراء

الوقت/التاريخ: _____

المكان: _____

إذا كان لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بمُقدِّم الرعاية الصحية المتابع لحالتك على:

يُرجى قراءة كامل المعلومات الخاصة بوصف الدواء ودليل المعالجة المُرفقين في العبوة.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج، يُرجى الاتصال برقم 1-800-874-6756.