

의료서비스 제공자 정보

이름: _____
 주소: _____
 도시: _____
 주: _____ 우편번호: _____
 전화: _____ 팩스: _____

SUFLAVE™
 (경구 용액용 폴리에틸렌글리콜
 3350, 황산나트륨, 염화칼륨,
 황산마그네슘 및 염화나트륨)
 178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g



SUFLAVE 투여 용법

SUFLAVE는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 대장내시경 준비를 완료하기 위해 총 2개의 병이 필요합니다. 2병의 액체를 2회의 별도 용량으로 복용합니다. SUFLAVE 1회 용량은 1병과 향미 개선 패킷 1개를 더한 것과 같습니다.

병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

제1일, 투여 1: 대장내시경 전날 초저녁

오후 _____ 에 투여 1을 시작합니다.

- 1단계** 향미 개선 패킷 1개를 열어 내용물을 병 하나에 붓습니다.
- 2단계** 제공된 병에 **미지근한** 물을 채움선까지 채웁니다. 병 뚜껑을 닫은 후 모든 분말이 잘 섞일 때까지(용해될 때까지) 병을 부드럽게 흔듭니다. 최상의 맛을 위해 마시기 전에 한 시간 동안 용액을 냉장 보관하십시오. 얼리지 마십시오. 24시간 내에 사용하십시오.
- 3단계** 병이 비워질 때까지 15분마다 8온스의 용액을 마십니다.
- 4단계** 저녁 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

중요: 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.




병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

제2일, 투여 2: 대장내시경 검사일 아침(대장내시경 검사 5~8시간 전, 그리고 투여 1을 시작한지 적어도 4시간 후)

오전 _____ 에 투여 2를 시작합니다.

- 1단계** 제1일, 투여 1의 1~3단계를 반복합니다.
- 2단계** 오전 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

중요: 대장내시경을 받을 때까지 계속해서 맑은 액체류만 마십니다. 대장내시경 최소 2시간 전에 액체류를 마시는 것을 중단합니다.



병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

대장내시경 최소 2시간 전에 액체류를 마시는 것을 중단합니다.

추가 지침은 뒷면을 참조하십시오.



대장내시경 검사 전날 음식물 섭취 안내

저잔류 식이 요법을 따르고 장 정결을 시작한 후에는 아무것도 먹지 마십시오. 의사가 달리 지시하지 않는 한 허용된 것을 먹습니다.

할 수 있는 것

- 잔류물이 적은 아침식사만 할 수 있습니다. 잔류물이 적은 아침식사를 위한 식품에는 계란, 흰 빵, 코티지 치즈, 요구르트, 그릿츠(옥수수죽), 커피 및 차가 포함됩니다.
- 맑은 액체류를 마실 수 있습니다.

할 수 없는 것

- 우유를 마시면 안 되며, 빨간색이나 보라색의 음식을 먹거나 음료를 마셔서는 안 됩니다.
- 술을 마시지 마십시오.
- SUFLAVE 복용 중 기타 완하제를 복용하지 마십시오.
- 각 SUFLAVE 투여를 시작하기 1시간 전에 다른 경구 약물을 복용하지 마십시오.
- 테트라사이클린 또는 플루오로퀴놀론 항생제, 철분, 디곡신, 클로르프로마진 또는 페니실라민을 복용 중인 경우, 각 SUFLAVE 용량을 투여하기 최소 2시간 전 및 최소 6시간 이후에 이러한 약물을 복용하십시오.

마셔도 괜찮은 액체류

- 커피, 차(크림이나 비 유제품 크림은 안 됨)
- 과일주스(과육 없이)
- 젤라틴 디저트류(과일이나 고명 없이)
- 물
- 레몬에이드
- 닭육수

참고

- SUFLAVE는 성인의 대장내시경 검사 준비를 위한 결장 세척에 사용하는 삼투성 완하제입니다.
- 복용 중인 모든 약물을 의사에게 알려 주십시오. 여기에는 처방 및 비처방 약물, 비타민 및 약초 보충제가 포함됩니다. SUFLAVE가 다른 약물의 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 각 SUFLAVE 용량 투여를 시작하기 전 1시간 이내에 경구 약물을 복용하면 제대로 흡수되지 않을 수 있습니다.
- SUFLAVE 투여 후 가장 흔하게 발생하는 이상반응은 메스꺼움, 복부 팽만, 구토, 복부 통증 및 두통이었습니다.
- 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 응액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.
- SUFLAVE 복용 후 심각한 구토 또는 탈수 증상이 발생하거나 부정맥 또는 발작을 경험하는 경우 의료서비스 제공자에게 연락하십시오.
- SUFLAVE 복용에 관한 문의 사항이 있는 경우, 담당 의사에게 연락하십시오.

(추가 지침은 다른 페이지를 참조하십시오.)

의료서비스 제공자의 특별 지침

시술

시간/날짜: _____

장소: _____

문의 사항이 있는 경우, 다음 연락처로 의료서비스 제공자에게 연락하십시오.

키트에 있는 처방 정보 및 약물 지침을 모두 읽으십시오.

본 제품에 관해 더 알아보시려면 1-800-874-6756으로 연락하십시오.

교육 서비스 제공  **Braintree**
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®