

## 医务人员信息

姓名: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_  
城市: \_\_\_\_\_  
州/省: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

# SUFLAVE™

(聚乙二醇 3350、硫酸钠、氯化钾、硫酸镁和氯化钠口服溶液)

178.7 克/7.3 克/1.12 克/0.9 克/0.5 克



## SUFLAVE 给药方案

SUFLAVE 为分剂量 (2 天) 给药方案。为了完成结肠镜检查的准备, 共需要服用 2 瓶药液。您将分两次服用 2 瓶药液。一剂 SUFLAVE 等于一瓶药粉加一个增味包。

药瓶和增味包均非实际尺寸。

### 第 1 天, 第 1 剂: 在您进行结肠镜检查的头天傍晚

下午 \_\_\_\_\_ 点, 开始服用第 1 剂。

**第 1 步** 打开 1 个增味包, 将内容物倒入 1 个瓶子中。

**第 2 步** 往准备好的瓶中加入温水, 最多加至标示的水位线。盖好瓶盖后, 请轻摇瓶身, 直至所有粉末完全融合 (溶解)。将药液放置冰箱冷藏一小时再饮用, 味道更佳。请勿冷冻。请在 24 小时内饮用。

**第 3 步** 每 15 分钟饮 8 盎司, 直到瓶空。

**第 4 步** 晚间额外饮用 16 盎司的水。

**注意:** 如出现恶心、腹胀或腹部痉挛, 在症状减轻之前, 请暂停饮用药液和水, 或降低饮用频率。

### 第 2 天, 第 2 剂: 在结肠镜检查日的早晨 (结肠镜检查前 5 至 8 个小时, 并且不早于开始服用第 1 剂 4 小时后)

上午 \_\_\_\_\_ 点, 开始服用第 2 剂。

**第 1 步** 重复第 1 天第 1 剂中的第 1 至第 3 步。


**第 2 步** 早上额外饮用 16 盎司的水。

**注意:** 在结肠镜检查前, 请继续只饮用澄清的液体。结肠镜检查前至少 2 小时停止饮用所有液体。

结肠镜检查前至少 2 小时停止饮用所有液体。



图中药瓶和增味包均非实际尺寸。



图中药瓶和增味包均非实际尺寸。



# 成品

请参阅另一面以获取其他说明。

