

Zabieg zostanie przeprowadzony przez lekarza:

Adres: _____

Data badania: _____ Godzina zgłoszenia się na badanie: _____

Uwagi: _____

Co jeść na dzień PRZED zabiegiem kolonoskopii

Należy stosować dietę ubogoresztkową i nie jeść niczego po rozpoczęciu przyjmowania preparatu do przygotowania jelit. Należy jeść produkty dozwolone, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Co JEST dozwolone

- Można zjeść śniadanie składające się tylko z ubogoresztkowych produktów żywnościowych. Ubogoresztkowe produkty żywnościowe na śniadanie obejmują jajka, biały chleb, twarożek, jogurt, płatki owsiane, kawę i herbatę.
- Można przyjmować klarowne płyny.

Co NIE JEST dozwolone

- Nie wolno pić mleka oraz jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu.
- Nie wolno pić alkoholu.
- Nie przyjmować żadnych innych środków przeczyszczających w okresie przyjmowania SUFLAVE.
- Nie przyjmować leków doustnie na 1 godzinę przed rozpoczęciem każdej z dawek SUFLAVE.
- W przypadku przyjmowania antybiotyków z grupy tetracyklin lub fluorochinolonów, preparatów żelaza, digoksyny, chloropromazyny lub penicylaminy należy je przyjąć najpóźniej na dwie godziny przed i nie wcześniej niż 6 godzin po przyjęciu każdej z dawek SUFLAVE.

DOZWOLONE płyny

- Kawa, herbata (bez zabielaacza na bazie mleka lub niezawierającego mleka)
- Soki OWOCOWE (bez miąższu)
- Desery galaretkowe (bez owoców lub przybrania)
- Woda
- Lemoniada
- Bulion z kurczaka

Uwaga

- SUFLAVE jest osmotycznym środkiem przeczyszczającym przeznaczonym do oczyszczania jelita grubego u osób dorosłych w ramach przygotowania się do zabiegu kolonoskopii.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych. SUFLAVE może wpływać na działanie innych leków.
- Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać odpowiednio wchłonięte w przypadku ich przyjęcia w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem każdej z dawek SUFLAVE.
- Najpowszechniejszymi działaniami niepożądanymi po przyjęciu SUFLAVE były nudności, wzdęcia, wymioty, ból brzucha i bóle głowy.
- Jeżeli wystąpią nudności, wzdęcia lub skurcze brzucha, wstrzymaj lub zmniejsz tempo picia roztworu i dodatkowej wody aż do osłabnięcia objawów.
- W przypadku wystąpienia ciężkich wymiotów lub oznak odwodnienia po przyjęciu SUFLAVE lub w razie wystąpienia arytmii serca lub napadów drgawkowych należy skontaktować się z dostawcą usług medycznych.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SUFLAVE należy zadzwonić do swojego lekarza.

Należy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowania leku, które załączono do zestawu.

Informacje o tym produkcie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-874-6756.



Butelki i saszetki nie są przedstawione zgodnie z ich rzeczywistym rozmiarem.

SUFLAVE™
(glikol polietylenowy 3350, siarczan sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu i chlorek sodu do sporządzania roztworu doustnego)

178,7 g / 7,3 g / 1,12 g / 0,9 g / 0,5 g

Dawkowanie

SUFLAVE należy przyjmować w dawce dzielonej (przez 2 dni). Łącznie potrzebne są 2 butelki do całkowitego przygotowania się do kolonoskopii. Należy przyjąć 2 butelki płynu w dwóch osobnych dawkach. Jedna dawka SUFLAVE odpowiada jednej butelce z jedną saszetką substancji poprawiającej smak.



Dzień 1, dawka 1: wcześniej wieczorem na dzień przed zabiegiem kolonoskopii

Rozpoczęcie dawki 1 o godzinie _____ wieczorem.

KROK 1

Otwórz 1 saszetkę z substancją poprawiającą smak i wysyp jej zawartość do 1 butelki.

KROK 2

Napełnij dostarczoną butelkę letnią wodą do linii napełnienia. Po zamknięciu butelki delikatnie nią potrząśnij, aż cały proszek dobrze się wymiesza (rozpuści). Aby zapewnić jak najlepszy smak, należy schłodzić przygotowany roztwór w lodówce przez godzinę przed spożyciem. Nie zamrażać. Zużyć w ciągu 24 godzin.

KROK 3

Pij po 8 uncji roztworu co 15 minut, aż opróżnisz butelkę.

KROK 4

W ciągu wieczoru wypij jeszcze dodatkowe 16 uncji wody.

WAŻNE: Jeżeli wystąpią nudności, wzdęcia lub skurcze brzucha, wstrzymaj lub zmniejsz tempo picia roztworu i dodatkowej wody aż do osłabnięcia objawów.



Butelki i saszetki nie są przedstawione zgodnie z ich rzeczywistym rozmiarem.

Dzień 2, dawka 2: rano w dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, lecz nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1)

Rozpoczęcie dawki 2 o godzinie _____ rano.


KROK 1

Powtórz kroki 1 do 3 z dnia 1, dawki 1.

KROK 2

Rano wypij jeszcze dodatkowe 16 uncji wody.

WAŻNE: Do czasu wykonania kolonoskopii należy kontynuować przyjmowanie wyłącznie klarownych płynów. Należy zakończyć przyjmowanie płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią.



Butelki i saszetki nie są przedstawione zgodnie z ich rzeczywistym rozmiarem.

Należy zakończyć przyjmowanie płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią.

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przez **Braintree**
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®