

为您进行检查的医生：

地址：\_\_\_\_\_

检查日期：\_\_\_\_\_ 抵达时间：\_\_\_\_\_ 上午/下午

备注：\_\_\_\_\_



仅供参考。

**SUFLAVE**<sup>®</sup>  
(polyethylene glycol 3350,  
sodium sulfate, potassium chloride,  
magnesium sulfate, and sodium  
chloride for oral solution)  
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g

## 结肠镜检查前一天可进食的食物

请遵循低渣饮食进食方案，开始肠道准备后请勿进食任何食物。除非医生另有医嘱，否则仅进食允许的食物。

### 您可以做哪些事

- 您仅可食用低渣早餐。低渣食物包括鸡蛋、白面包、干酪、酸奶、粗玉米粉、咖啡和茶。
- 您可以饮用澄清液体。

### 您不可以做哪些事

- 切勿饮用牛奶，切勿食用或饮用任何红色或紫色的食物或饮品。
- 切勿饮酒。
- 服用 SUFLAVE 时，切勿服用其他泻药。
- 在每次开始服用 SUFLAVE 前的 1 小时内，切勿服用口服药物。
- 如果服用四环素或氟喹诺酮类抗生素、铁、地高辛、氯丙嗪或青霉素，则应在每次服用 SUFLAVE 的至少 2 小时前和不少于 6 小时后服用上述药物。

### 可以饮用的液体

- 咖啡或茶（不含奶油或非乳制奶精）
- 果汁（不含果肉）
- 明胶甜点（不含水果或打顶奶油）
- 水
- 柠檬汁
- 鸡汤

### 注释

- SUFLAVE 是一种渗透性泻药，可用于清洁结肠，为成人结肠镜检查做好准备。
- 请务必告知您的医生您所服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。SUFLAVE 可能会影响其他药物的药效。
- 如果在开始服用每剂 SUFLAVE 前 1 小时内口服其他药物，药物可能无法正常吸收。
- 服用 SUFLAVE 后最常见的不良反应是恶心、腹胀、呕吐、腹痛和头痛。
- 若出现恶心、腹胀或腹部痉挛，在症状减轻之前，请暂停饮用溶液和水，或降低饮用频率。
- 如果服用后 SUFLAVE 出现严重的呕吐或脱水体征，或者出现心律不齐或癫痫发作，请与您的医务人员联系。
- 如果您对服用 SUFLAVE 有任何疑问，请致电您的医生。

请阅读药盒中的完整处方信息和药物指南。

欲了解有关此产品的更多信息，请致电 1-800-461-7449。

## 给药方案

SUFLAVE 为分剂量 (2 天) 给药方案。为了完成结肠镜检查准备，共需要服用 2 瓶药液。您将分两次服用 2 瓶药液。一剂 SUFLAVE 等于一瓶药粉加一个增味包。



### 第 1 天，第 1 剂：在您进行结肠镜检查的头天傍晚

下午 \_\_\_\_\_ 点，开始服用第 1 剂。

**第 1 步** 打开 1 个增味包，将内容物倒入 1 个瓶子中。

**第 2 步** 往准备好的瓶中加入温水，最多加至标示的水位线。盖好瓶盖后，请轻轻摇瓶身，直至所有粉末完全融合（溶解）。将药液放置冰箱冷藏一小时再饮用，味道更佳。请勿冷冻。请在 24 小时内饮用。

**第 3 步** 每 15 分钟饮 8 盎司，直到瓶空。

**第 4 步** 晚间额外饮用 16 盎司的水。

**注意：**若出现恶心、腹胀或腹部痉挛，在症状减轻之前，请暂停饮用溶液和水，或降低饮用频率。



仅供参考。

### 第 2 天，第 2 剂：在结肠镜检查日的早晨（结肠镜检查前 5 至 8 个小时，并且不早于开始服用第 1 剂 4 小时后）

上午 \_\_\_\_\_ 点，开始服用第 2 剂。

**第 1 步** 重复第 1 天第 1 剂中的第 1 至第 3 步。

**第 2 步** 早上额外饮用 16 盎司的水。

**注意：**在结肠镜检查结束之前，请仅摄入清澈液体。请在结肠镜检查前至少 2 小时停止饮用液体。



仅供参考。

作为来自下列机构的教育服务而提供

