

시술을 수행하는 의사:

주소: \_\_\_\_\_

시술 일자: \_\_\_\_\_ 도착 시각: 오전/오후 \_\_\_\_\_

메모: \_\_\_\_\_

## 대장내시경 검사 전날 음식물 섭취 안내

저잔류 식이 요법을 따르고 장 정결을 시작한 후에는 아무것도 먹지 마십시오. 의사가 달리 지시하지 않는 한 허용된 것을 먹습니다.

### 할 수 있는 것

- 잔류물이 적은 아침식사만 할 수 있습니다. 잔류물이 적은 아침식사를 위한 식품에는 계란, 흰 빵, 코티지 치즈, 요구르트, 그릿츠(옥수수죽), 커피 및 차가 포함됩니다.
- 맑은 액체류를 마실 수 있습니다.

### 할 수 없는 것

- 우유를 마시면 안 되며, 빨간색이나 보라색의 음식을 먹거나 음료를 마셔서는 안 됩니다.
- 술을 마시지 마십시오.
- SUFLAVE 복용 중 기타 완하제를 복용하지 마십시오.
- 각 SUFLAVE 투여를 시작하기 1시간 전에 다른 경구 약물을 복용하지 마십시오.
- 테트라사이클린 또는 플루오로퀴놀론 항생제, 철분, 디곡신, 클로르프로마진 또는 페니실라민을 복용 중인 경우, 각 SUFLAVE 용량을 투여하기 최소 2시간 전 및 최소 6시간 이후에 이러한 약물을 복용하십시오.

### 마셔도 괜찮은 액체류

- 커피, 차(크림이나 비 유제품 크림머는 안 됨)
- 과일주스(과육 없이)
- 젤라틴 디저트류(과일이나 고명 없이)
- 물
- 레몬에이드
- 닭육수

### 참고

- SUFLAVE는 성인의 대장내시경 검사 준비를 위한 결장 세척에 사용하는 삼투성 완하제입니다.
- 복용 중인 모든 약물을 의사에게 알려 주십시오. 여기에는 처방 및 비처방 약물, 비타민 및 약초 보충제가 포함됩니다. SUFLAVE가 다른 약물의 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 각 SUFLAVE 용량 투여를 시작하기 전 1시간 이내에 경구 약물을 복용하면 제대로 흡수되지 않을 수 있습니다.
- SUFLAVE 투여 후 가장 흔하게 발생하는 이상반응은 메스꺼움, 복부 팽만, 구토, 복부 통증 및 두통이었습니다.
- 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.
- SUFLAVE 복용 후 심각한 구토 또는 탈수 증상이 발생하거나 부정맥 또는 발작을 경험하는 경우 의료서비스 제공자에게 연락하십시오.
- SUFLAVE 복용에 관한 문의 사항이 있는 경우, 담당 의사에게 연락하십시오.

키트에 있는 처방 정보 및 약물 지침을 모두 읽으십시오.  
본 제품에 대해 자세히 알아보려면 1-800-461-7449번으로 전화하십시오.



이해를 돕기 위한 예시입니다.

**SUFLAVE®**  
(polyethylene glycol 3350,  
sodium sulfate, potassium chloride,  
magnesium sulfate, and sodium  
chloride for oral solution)  
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g

## 투여 용법

SUFLAVE는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 대장내시경 준비를 완료하기 위해 총 2개의 병이 필요합니다. 2병의 액체를 2회의 별도 용량으로 복용합니다. SUFLAVE 1회 용량은 1병과 향미 개선 패킷 1개를 더한 것과 같습니다.



### 제1일, 투여 1: 대장내시경 전날 초저녁

오후 \_\_\_\_\_ 에 투여 1을 시작합니다.

#### 1단계

향미 개선 패킷 1개를 열어 내용물을 병 하나에 붓습니다.

#### 2단계

제공된 병에 미지근한 물을 채움선까지 채웁니다. 병 뚜껑을 닫은 후 모든 분말이 잘 섞일 때까지(옹해될 때까지) 병을 부드럽게 흔들니다. 최상의 맛을 위해 마시기 전에 한 시간 동안 용액을 냉장 보관하십시오. 얼리지 마십시오. 24시간 내에 사용하십시오.

#### 3단계

병이 비워질 때까지 15분마다 8온스의 용액을 마십니다.

#### 4단계

저녁 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

**중요:** 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.



이해를 돕기 위한 예시입니다.

### 제2일, 투여 2: 대장내시경 검사일 아침(대장내시경 검사 5-8시간 전, 그리고 투여 1을 시작할지 적어도 4시간 후)

오전 \_\_\_\_\_ 에 투여 2를 시작합니다.

#### 1단계

제1일, 투여 1의 1-3단계를 반복합니다.

#### 2단계

오전 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

**중요:** 대장내시경 검사 후까지 맑은 액체만 섭취하십시오. 대장내시경 검사 최소 2시간 전부터는 액체 섭취를 중단하십시오.



이해를 돕기 위한 예시입니다.

교육 서비스의 일환으로 제공

