

Seu procedimento será realizado pelo(a) Dr(a):

Endereço: _____

Data do procedimento: _____ Chegar às: _____ h

Observações: _____

O que comer no dia ANTERIOR à colonoscopia

Siga uma dieta com baixo teor de resíduos e não coma nada depois de iniciar a preparação intestinal. Coma o que for permitido, a menos que receba outra orientação do seu médico.

O que você PODE fazer

- Você pode tomar somente um café da manhã com baixo teor de resíduos. Alimentos para um café da manhã com baixo teor de resíduos incluem ovos, pão branco, queijo cottage, iogurte, grits, café e chá.
- Você pode beber líquidos transparentes.

O que você NÃO PODE fazer

- Não beba leite e nem coma ou beba nada de cor vermelha ou roxa.
- Não tome bebidas alcoólicas.
- Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando SUFLAVE.
- Não tome medicamentos orais menos de 1 hora do início de cada dose de SUFLAVE.
- Caso esteja tomando antibióticos de tetraciclina ou fluoroquinolona, ferro, digoxina, clorpromazina ou penicilamina, tome esses medicamentos pelo menos 2 horas antes e no mínimo 6 horas depois da administração de cada dose de SUFLAVE.

Líquidos que PODEM ser ingeridos

- Café, chá (sem leite nem creme não lácteo)
- Suco de frutas (sem polpa)
- Gelatina (sem frutas ou outras coberturas)
- Água
- Limonada
- Caldo de galinha

Observação

- SUFLAVE é um laxante osmótico indicado para a limpeza do cólon como parte do preparo para a colonoscopia em adultos.
- Certifique-se de informar ao seu médico todos os medicamentos que você usa, o que inclui medicamentos (receitados ou não), vitaminas e fitoterápicos. O SUFLAVE pode afetar o modo como outros medicamentos atuam.
- Medicamentos tomados por via oral podem não ser absorvidos adequadamente quando ingeridos menos de 1 hora antes do início de cada dose de SUFLAVE.
- As reações adversas mais comuns após a administração de SUFLAVE são náusea, distensão abdominal, vômitos, dor abdominal e dor de cabeça.
- Em caso de náusea, gases ou cólicas abdominais, pause ou reduza o ritmo de ingestão da solução e da água adicional até a diminuição dos sintomas.
- Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde caso comece a vomitar de maneira intensa ou desenvolva sinais de desidratação após o uso de SUFLAVE, ou se apresentar arritmias cardíacas ou convulsões.
- Em caso de dúvidas sobre o uso do SUFLAVE, ligue para o seu médico.

Leia a bula completa e o Guia de Medicação contidos no kit.
Para saber mais sobre este produto, ligue para 1-800-461-7449.



Imagem meramente ilustrativa.

SUFLAVE®
(polyethylene glycol 3350,
sodium sulfate, potassium chloride,
magnesium sulfate, and sodium
chloride for oral solution)
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g

Esquema posológico

SUFLAVE deve ser administrado em um esquema de dose dividida (2 dias). No total, devem ser tomados 2 frascos para completar o preparo para a colonoscopia. Você beberá dois frascos de líquido, divididos em duas doses. Uma dose de SUFLAVE equivale a um frasco mais um sachê de melhoria de sabor.



Dia 1, Dose 1: no começo da noite anterior à colonoscopia

Inicie a Dose 1 às _____ h.

ETAPA 1

Abra um sachê de melhoria de sabor e despeje o conteúdo em um frasco.

ETAPA 2

Preencha o frasco fornecido com água **morna** até a linha de preenchimento marcada. Depois de tampar o frasco, agite-o levemente até a mistura (dissolução) de todo o pó. Para obter um melhor sabor, resfrie a solução por uma hora antes de beber. Não congelar. Usar em até 24 horas.

ETAPA 3

Beba 250 mL da solução a cada 15 minutos até esvaziar o frasco.

ETAPA 4

Beba mais 500 mL de água durante a noite.

IMPORTANTE: Em caso de náusea, gases ou cólicas abdominais, pause ou reduza o ritmo de ingestão da solução e da água adicional até a diminuição dos sintomas.




Imagem meramente ilustrativa.

Dia 2, Dose 2: na manhã do dia da colonoscopia (5 a 8 horas antes da colonoscopia e não menos de 4 horas após o início da Dose 1)

Inicie a Dose 2 às _____ h.

ETAPA 1

Repita as Etapas 1 a 3 do Dia 1, Dose 1.

ETAPA 2

Beba mais 500 mL de água durante a manhã.

IMPORTANTE: Continue a ingerir apenas líquidos transparentes até depois da colonoscopia. Pare de beber líquidos pelo menos 2 horas antes da colonoscopia.



Imagem meramente ilustrativa.

Fornecido como serviço educacional por



© 2026 Azurity Pharmaceuticals, Inc.

SUFLAVE® é uma marca registrada de Azurity Pharmaceuticals, Inc.

PP-SUF-6540-US-EN-V1-F Fevereiro de 2026