

의료서비스 제공자 정보

이름: _____
 주소: _____
 도시: _____
 주: _____ 우편번호: _____
 전화: _____ 팩스: _____

SUFLAVE®
 (polyethylene glycol 3350,
 sodium sulfate, potassium chloride,
 magnesium sulfate, and sodium
 chloride for oral solution)
 178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g



SUFLAVE 투여 용법

SUFLAVE는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 대장내시경 준비를 완료하기 위해 총 2개의 병이 필요합니다. 2병의 액체를 2회의 별도 용량으로 복용합니다. SUFLAVE 1회 용량은 1병과 향미 개선 패킷 1개를 더한 것과 같습니다.

이해를 돕기 위한 예시입니다.

제1일, 투여 1: 대장내시경 전날 초저녁

오후 _____ 에 투여 1을 시작합니다.

- 1단계** 향미 개선 패킷 1개를 열어 내용물을 병 하나에 붓습니다.
- 2단계** 제공된 병에 미지근한 물을 채움선까지 채웁니다. 병 뚜껑을 닫은 후 모든 분말이 잘 섞일 때까지(용해될 때까지) 병을 부드럽게 흔듭니다. 최상의 맛을 위해 마시기 전에 한 시간 동안 용액을 냉장 보관하십시오. 얼리지 마십시오. 24시간 내에 사용하십시오.
- 3단계** 병이 비워질 때까지 15분마다 8온스의 용액을 마십니다.
- 4단계** 저녁 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

중요: 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.




이해를 돕기 위한 예시입니다..

제2일, 투여 2: 대장내시경 검사일 아침(대장내시경 검사 5~8시간 전, 그리고 투여 1을 시작한지 적어도 4시간 후)

오전 _____ 에 투여 2를 시작합니다.

- 1단계** 제1일, 투여 1의 1~3단계를 반복합니다.
- 2단계** 오전 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

중요: 대장내시경 검사 후까지 맑은 액체만 섭취하십시오. 대장내시경 검사 최소 2시간 전부터는 액체 섭취를 중단하십시오.



이해를 돕기 위한 예시입니다..



추가 지침은 뒷면을 참조하십시오.

