

## ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Название: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_

Штат: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

# SUFLAVE®

(polyethylene glycol 3350,  
sodium sulfate, potassium chloride,  
magnesium sulfate, and sodium  
chloride for oral solution)  
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g



## SUFLAVE Схема применения препарата

Препарат SUFLAVE принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуются 2 флакона. Вам будет нужно принять 2 флакона жидкости за два отдельных приема. Одна доза препарата SUFLAVE равна одному флакону плюс один пакетик с ароматизатором.

Только для ознакомительных целей.

### День 1, доза 1: рано вечером в день перед колоноскопией

Примите дозу 1 в \_\_\_\_\_ вечера.

**ШАГ 1** Откройте 1 пакетик с ароматизатором и пересыпьте его содержимое в 1 флакон.

**ШАГ 2** Наполните этот флакон слегка теплой водой до линии заполнения. Закройте флакон и осторожно встряхните его, чтобы весь порошок хорошо перемешался (растворился). Для улучшения вкуса охладите раствор в течение часа до употребления. Не замораживайте. Используйте в течение 24 часов.

**ШАГ 3** Выпивайте по 8 унций (236 мл) раствора каждые 15 минут, пока флакон не опустеет.

**ШАГ 4** Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение вечера.

**ВНИМАНИЕ:** при появлении тошноты, вздутия живота или спазмов в животе, сделайте паузу или пейте раствор и дополнительную воду медленнее, пока симптомы не уменьшатся.



Пакетик с ароматизатором + 1-литровый флакон



Только для ознакомительных целей.


### День 2, доза 2: утром в день колоноскопии (за 5–8 часов до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1)

Примите дозу 2 в \_\_\_\_\_ утра.

**ШАГ 1** Повторите шаги 1–3, указанные для приема дозы 1 в день 1.

**ШАГ 2** Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение утра.

**ВНИМАНИЕ:** Продолжайте употреблять только прозрачные жидкости до окончания колоноскопии. Прекратите употребление жидкостей как минимум за 2 часа до колоноскопии.



Только для ознакомительных целей.



См. дополнительные указания на обратной стороне.

