

THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tên: _____

Địa chỉ: _____

Thành phố: _____

Tiểu bang: _____ Mã ZIP: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

SUFLAVE®

(polyethylene glycol 3350,
sodium sulfate, potassium chloride,
magnesium sulfate, and sodium
chloride for oral solution)
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g



Phác đồ Dùng thuốc SUFLAVE

SUFLAVE là phác đồ chia liều (2 ngày). Phải dùng tổng cộng 2 chai thuốc để chuẩn bị đầy đủ cho thủ thuật nội soi đại tràng. Quý vị sẽ uống 2 chai chất lỏng trong hai liều dùng riêng biệt. Một liều SUFLAVE tương đương với một chai cộng với một gói tăng hương vị.

Chỉ dành để minh họa.

Ngày 1, Liều 1: Vào đầu buổi tối trước ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

Bắt đầu Liều 1 lúc ____ Tối.

BƯỚC 1 Mở 1 gói tăng hương vị và đổ các chất bên trong vào 1 chai.

BƯỚC 2 Rót nước ấm vào chai được cung cấp, đến vạch đánh dấu. Sau khi đập nắp chai, lắc nhẹ chai cho đến khi tất cả bột được trộn đều (hòa tan). Để có hương vị tốt nhất, hãy ướp lạnh dung dịch trong một giờ trước khi uống. Không làm đông lạnh Sử dụng trong vòng 24 giờ

BƯỚC 3 Uống 8 ounce dung dịch cứ mỗi 15 phút cho đến khi hết chai.

BƯỚC 4 Uống thêm 16 ounce nước vào buổi tối hôm đó.

QUAN TRỌNG: Nếu bị buồn nôn, đầy hơi hoặc đau quặn bụng, hãy tạm dừng hoặc giảm tốc độ uống dung dịch và nước bổ sung cho đến khi các triệu chứng giảm bớt.



Chỉ dành để minh họa.


Ngày 2, Liều 2: Vào buổi sáng ngày thực hiện Nội soi đại tràng (từ 5 đến 8 giờ trước khi nội soi đại tràng và không sớm hơn 4 giờ kể từ khi bắt đầu dùng Liều 1)

Bắt đầu Liều 2 lúc ____ Sáng.

BƯỚC 1 Lặp lại Bước 1 đến Bước 3 giống như Ngày 1, Liều 1.

BƯỚC 2 Uống thêm 16 ounce nước vào buổi sáng hôm đó.

QUAN TRỌNG: Tiếp tục chỉ uống các chất lỏng trong suốt cho đến sau khi nội soi đại tràng. Ngừng uống chất lỏng ít nhất 2 giờ trước khi nội soi đại tràng.



Chỉ dành để minh họa.



Vui lòng xem hướng dẫn bổ sung ở mặt kia.

KẾT THÚC

PP-SUF-6542-US-EN-v1-I Tháng 2 năm 2026